


Lechuguilla dulce (*Reichardia gaditana*)



Especie	<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Cotohno
Nombre común	Lechuguilla dulce
Sinonimias	<i>Picidium gaditanum</i> Willk. in Willk. & Lange, <i>Picidium tingitanum</i> (L.) Desf. var. <i>gaditanum</i> (Willk.) Pérez Lara
Grupo	ANGIOSPERMAS
Familia	<i>Compositae</i> (Compuestas)
Tipo Biológico	Hemicriptófito escaposo
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias	Especie de interés especial
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas	
Directiva Hábitats	

Descripción de la Lechuguilla dulce

Planta bianual o perenne, herbácea o ligeramente leñosa en la base. Raíz pivotante. Tallos erectos, glabros, de hasta 50 cm de altura muy ramificados en la parte superior.

Hojas glaucas, rara vez papilosas, de dentadas a pinnatipartidas; las superiores abrazando el tallo mediante dos orejuelas redondeadas.

Flores hermafroditas, reunidas en tres o cuatro capítulos terminales portados sobre pedúnculos clavados, es decir ensanchados en el ápice. Cada uno de ellos posee un involucre de 14-22 x 15-24 mm, formado por numerosas brácteas terminadas en un mucrón; las externas son ovadas, acuminadas, de base cordada o auriculada y margen ferrugíneo-escarioso; las medias generalmente acuminadas, auriculadas en la base y con margen escarioso; las internas triangular-lanceoladas, generalmente con un estrecho margen escarioso.

Las flores son todas liguladas, de color amarillo dorado y rojizas en la parte inferior; las más externas en el capítulo con una banda púrpura en el dorso. Cinco estambres con anteras de color rosado y púrpuras en el ápice y connadas, formando un tubo alrededor del estilo. Ovario ínfero, unilocular y con un sólo primordio seminal, estilo único, rematado en dos ramas estigmáticas.

Frutos de tipo aquenio; los externos en el capítulo de 2-3.4 mm, con cuatro costillas tuberculadas transversalmente y de color pardo; los internos de 3-4 mm, de poligonales a piramidal-truncados, con cuatro costillas lisas y de color blanquecino; rematados en un penacho de pelos (vilano) de 11 a 14 mm formado por numerosas filas de pelos simples, es decir no ramificados.

Se reproduce preferentemente por semillas.

Hábitat

Dunas secundarias o grises.

Comportamiento fitosociológico

Forma parte, fundamentalmente, de las comunidades vegetales propias de las dunas secundarias clasificables en el Orden *Crucianelletalia maritima* (Clase *Ammophiletea*).

Amenazas

Son consecuencia de la utilización de los espacios dunares por el hombre.

Distribución

Litoral atlántico de la Península Ibérica, desde Cádiz a Asturias, y noroeste de Marruecos.

Poblaciones conocidas en Asturias

Playas de Penarronda (Castropol), Sarello (Tapia), Navia (Navia), La Arena y Bayas (Soto del Barco), Zeluán y Verdicio (Gozón).