

Rocío del sol de hoja larga (*Drosera anglica*)



Especie	<i>Drosera anglica</i>
Nombre común	Rocío del sol de hoja larga
Sinonimias	<i>Drosera longifolia</i> L.
Grupo	ANGIOSPERMAS
Familia	Droseraceae
Tipo Biológico	Hemicriptófito rosulado
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias	Especie sensible a la alteración de su hábitat
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas	
Directiva Hábitats	

Descripción del Rocío del sol de hoja larga

Planta perenne herbácea. Escapo de 10-20 cm, lateral y curvado en la base.
 Hojas dispuestas en roseta basal, erectas o inclinadas; lámina de cerca de 30 x 7 mm, linear-oblancoeladas; peciolo de 5-10 cm, glabro; haz cubierto con pelos largos y glandulosos de color rojo, mediante los cuales atrapa los insectos.
 Flores hermafroditas con 5-8 piezas dispuestas al final del escapo, blancas, ligeramente pediceladas; pétalos de 6 mm. Sépalos aplicado-conniventes. Estigmas enteros, blanquecinos.
 Fruto tipo cápsula lisa, sobrepasando los sépalos; semillas reticuladas, aladas.
 Se reproduce a través de semillas.

Hábitat

Zonas encharcadas de turberas de esfagnos de montaña.

Comportamiento fitosociológico

Comunidades de zonas turbosas de montaña, encharcadas, incluíbles en la Asociación *Drosero anglicae-Narthecietum ossifragi* (Alianza *Caricion fuscae*, Orden *Caricetalia fuscae*, Clase *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*).

Amenazas

Cualquier alteración en el sistema de turberas que pueda implicar una modificación en el hábitat altamente especializado en que vive la planta.

Distribución

Norte y Centro de Europa, rara en el Sur.

Poblaciones conocidas en Asturias

Turbera de Vega Cimera, Puerto de Somiedo (Somiedo)