


Sosa blanca, espejuelo (*Suaeda marina*)



Especie	<i>Suaeda marina</i> s.l.
Nombre común	Sosa blanca, espejuelo
Sinonimias	<i>Chenopodium maritimum</i> L.
Grupo	ANGIOSPERMAS
Familia	<i>Chenopodiaceae</i>
Tipo Biológico	Terófito escaposo.
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias	Especie sensible a la alteración de su hábitat
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas	
Directiva Hábitats	

En *Suaeda marina* s.l. se pueden distinguir dos especies: *Suaeda marina* (L.) Dumort y *Suaeda albescens* Lázaro Ibiza, ambas presentes en la costa asturiana.

Descripción de la Sosa blanca

Planta anual, verde glauca o rojiza. Tallos erectos de 10-45 cm (*S. marina*) o postrados y ramificados desde la base (*S. albescens*), herbáceos y duros en la base.

Hojas alternas y carnosas, subcilíndricas de 5 a 35 mm de longitud.

Flores hermafroditas reunidas en glomérulos axilares con 2 a 3 bracteolas en la base; éstos reúnen de 1 a 3 flores en *S. marina* y de 3 a 5 en *S. albescens*. Flores con cinco piezas de perianto, verdes y suculentas, cinco estambres y ovario súpero, unicarpelar y con un sólo primordio seminal.

Frutos aquenio uniseminado. Semillas negras, de más de 1,5 mm de diámetro en *S. marina* y generalmente menores en *S. albescens*.

La multiplicación de esta planta tiene lugar por medio de semillas.

Hábitat

Suaeda marina s. str. vive en suelos fangosos muy húmedos y salobres en la transición entre el infraestero y el supraestero de las marismas externas halófilas. *Suaeda albescens* vive en las mismas zonas aunque en suelos bien drenados, fundamentalmente arenosos.

Comportamiento fitosociológico

Suaeda marina s. str. Forma parte de comunidades de terófitos suculentos incluíbles en la Asociación *Suaedetum maritimi* (Alianza *Salicornion dolichostachyae*, Orden *Thero-Salicornietalia*, Clase *Thero-Salicornietea*).

Suaeda albescens domina en las comunidades de las asociaciones *Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae* y *Suaedetum vulgaris* (Alianza *Salicornion europaeo-ramosissimae*, Orden *Thero-Salicornietalia*, Clase *Thero-Salicornietea*).

Amenazas

Las que son consecuencia de la alteración de los hábitats en que se desarrolla la planta.

Distribución

Las áreas de distribución de *Suaeda marina* s. l. y el de las dos especies consideradas aquí no es bien conocido dadas las dificultades taxonómicas que encierra el grupo. De todos modos, parece que abarca todos los litorales atlánticos europeos.

Aunque se conocía en el litoral asturiano de algunos otros puntos en los últimos trabajos de campo únicamente se ha localizado en la ría de Villaviciosa.

Poblaciones conocidas en Asturias

Ría de Villaviciosa (Villaviciosa); señalada hace años en la Playa de la Paloma (Tapia de Casariego), no se ha visto recientemente.