

Andarriós chico (*Actitis hypoleucos*)

Especie	<i>Actitis hypoleucos</i>
Nombre común	Andarriós chico
Familia	<i>Scolopacidae</i>
Orden	Charadriiformes
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias	
PORNA	Especie singular
Catálogo Nacional de Fauna Amenazada	Especie de interés especial
Directiva Aves	
Convenio de Berna	*Anexo II
Convenio de Bonn	**Anexo II

*Convenio de Berna

Anexo II: Especies estrictamente protegidas

**Convenio de Bonn

Anexo II: Especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable y que precisan de la firma de acuerdos internacionales para su conservación

Descripción

El andarriós chico (*Actitis hypoleucos*) es un ave de apenas veinte centímetros de longitud, cuello corto, cola larga y patas bastante cortas con las que bascula a menudo su peso a la parte posterior del cuerpo. Además, su dorso pardo grisáceo, el vientre blanco y su marcado obispillo oscuro, le diferencian claramente de otros andarriós.

Suele observarse con postura muy erguida y con frecuencia sólo o en grupos que se mantienen dispersos entre sí, caminando a orillas del agua en busca de alimento.

Biología

Cría cerca del agua, a orillas de lagos y ríos de aguas rápidas y limpias, que presentan abundante vegetación de ribera. En otras épocas, es menos exigente en cuanto a la calidad del hábitat y frecuenta numerosos ambientes acuáticos. Así, durante los pasos migratorios y el invierno se le puede observar en llanuras intermareales, playas, zonas rocosas, estuarios, marismas y diversos hábitats relacionados con cauces de agua dulce, e incluso, hábitats antropogénicos.

Cuando cría parece ser que el andarriós chico se alimenta principalmente de insectos, especialmente de escarabajos, lombrices y arañas. Fuera de la época reproductora la dieta se vuelve más variada y se compone de crustáceos, gusanos y otros invertebrados marinos que localiza en los limos de los estuarios, las partes bajas de los ríos y las márgenes de algunas marismas.

Aunque no se conoce bien, parece que el periodo de reproducción del andarriós chico en la Península Ibérica es bastante corto y se produce durante los meses de mayo, junio y julio. Nidifica en hábitats de agua dulce, desde ríos y lagunas a embalses, siempre y cuando tengan un estado aceptable de conservación, abundante vegetación y tranquilidad. La puesta se realiza directamente sobre el suelo desnudo.

Estatus y distribución

Es una especie con amplia distribución paleártica, con áreas de cría extendidas por toda Europa, Asia interior y Boreal hasta Japón.

En España es una especie nidificante muy repartida y asociada a los grandes cauces de los ríos y los embalses, siendo más escasa en el centro, sur y este peninsular.

En Asturias durante la época reproductora se encuentra en cantidad moderada en varios ríos, dispersándose durante los pasos migratorios y la invernada por toda la costa, principalmente por los estuarios y por algunas zonas adecuadas del interior.