


## Narciso trompeta (*Narcissus pseudonarcissus* subsp. *leonensis*)



Especie	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>leonensis</i> (Pugsley) Fdez. Casas & Lainz
Nombre común	Narciso de trompeta
Sinonimias	<i>Narcissus nobilis</i> (Haw.) Schultes fil. var. <i>leonensis</i> (Pugsley) A. Fernandes.
Grupo	ANGIOSPERMAS
Familia	<i>Amaryllidaceae</i>
Tipo Biológico	Geófito bulboso
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias	Especie de interés especial
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas	
Directiva Hábitats	Especie de interés comunitario

### Descripción del Narciso trompeta

Planta perenne, glabra, bulbosa. Bulbo de 20-50 mm. Hojas de 15-50 cm x 8-15 mm, lineares, obtusas, erectas, glaucas, normalmente acanaladas. Escapo de 12-50(90) cm, más o menos comprimido. Espata de 20-60 mm, escariosa, envainante. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias o rara vez en umbelas de 2-4, horizontales o dirigidas hacia arriba. Pedicelo de 8-15(25) mm. Tubo del hipanto de 15-25 mm. Segmentos del perianto de 30-40(55) mm, amarillo pálido. Corona de 30-40(45) mm, amarilla, crenada o inciso-lobada. Androceo con 6 estambres, libres, insertos en el perianto; anteras introrsas. Ovario infero, tricarpelar, trilocular. Estilo solitario, más corto que la corona. Fruto tipo cápsula, de 12-25 mm, ovoide o subgloboso, más o menos trígono, polispermo. Se reproduce por semillas y por división del bulbo.

### Hábitat

Brezales, prados y claros de bosques.

### Comportamiento fitosociológico

Aparece en comunidades de las Clases *Molinio-Arrhenatheretea*, *Calluno-Ulicetea* y *Cytiseteta scopario-striati*.

### Amenazas

Las relacionadas con alteraciones del hábitat y recolección de flores.

### Distribución

Norte y centro de España.

### Poblaciones conocidas en Asturias

Algo frecuente en las zonas interiores.